

ANATIS BIOPROTECTION

nemaflor® F

Ravageurs ciblés

- Sciarides (mouches du terreau)
- Thrips
- Mineuses
- Aleurodes
- Mouches des rivages

Culture ciblées

- Cultures maraîchères en serre
- Fines herbes
- Cultures ornementales et plantes à fleurs
- Cultures de pépinière


nemaflor® F contient le nématode entomopathogène *Steinernema feltiae* ans une formulation de gel hydrosoluble Ecophyll® conçue pour les applications au sol et foliaires.

La formulation offre des conditions idéales pour la survie et la conservation à long terme des nématodes. Elle se dissout facilement dans l'eau, ne laisse aucun résidu visible sur les feuilles ou les fleurs et offre une grande flexibilité d'application par pulvérisation, arrosage du substrat ou systèmes d'irrigation. Elle est composée à 100 % de matières premières renouvelables.

nemaflor® F est approuvé pour la production biologique par OMRI et FiBL et peut être utilisé contre une gamme de ravageurs sensibles dans les cultures en serre et en plein champ.

Cycle de vie

- **Cycle de vie :** Environ 10 à 14 jours entre l'infection de l'hôte et l'émergence de nouveaux juvéniles infectieux, dans des conditions optimales.
- **Conditions optimales :** 15-20°C, sous des conditions d'humidité élevée.
- **Stade infectieux :** Les juvéniles infectieux (IJ) demeurent en arrêt de développement jusqu'à ce qu'un hôte approprié soit trouvé.



Dose d'application

Introduction	Quantité	Fréquence	Durée
Général	125 000–250 000/m²	Hebdomadaire	Jusqu'au contrôle

Application

nemaflor® F peut être appliqué par pulvérisation foliaire, arrosage du substrat ou à l'aide de systèmes d'irrigation compatibles. Appliquer lorsque la température du substrat se situe entre 10 et 28°C.

Application foliaire : Appliquer le soir ou par temps couvert. Une faible exposition aux UV et une humidité relative élevée sont nécessaires pour réduire la dessiccation et augmenter l'efficacité. Bien humidifier le feuillage traité sans provoquer de ruissellement excessif et maintenir les boutons, les fleurs et les feuilles humides pendant au moins **3 heures** après l'application. Utiliser un agent mouillant approprié au besoin.

Application au sol : Bien humidifier le substrat avant le traitement.

Lors de la pulvérisation, retirer les filtres et les tamis, utiliser des buses d'un diamètre minimal de 0,8 mm et maintenir la bouillie constamment sous agitation afin de garder les nématodes uniformément en suspension. Ne pas dépasser une pression de 5 bar.

Entreposage

- Utiliser dès que possible après la livraison. Si l'entreposage est nécessaire, conserver le produit au réfrigérateur entre 4 et 8 °C jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 30 °C.
- Ne pas congeler.